

臺灣菸酒股份有限公司 99 年第 2 次從業人員（相當評價職位人員）甄試試題

甄選職等／類別【代碼】：第 2 職等人員／護士【82411】

專業科目 3：公共衛生學概要

*請填寫入場通知書編號：

注意：①作答前須檢查答案卡、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。

②本試卷為一張單面共 40 題，每題 2.5 分，限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

③**本項測驗不得使用電子計算機。**

④**答案卡務必繳回，違反者該科成績以零分計算。**

【3】1.下列關於國內癌症防治計畫的癌症篩檢方式何者錯誤？

- ①子宮頸癌-子宮頸抹片
- ②乳癌-乳房攝影或超音波掃描
- ③結直腸癌-大腸鏡
- ④口腔癌-口腔黏膜檢查

【1】2.公共衛生護士在 H1N1 的防治工作中，哪一項屬於初段預防？

- ①施打疫苗
- ②協助病患隔離
- ③給予病患投藥治療
- ④發現病例

【2】3.下列何者為我國法定第一類傳染病，需於 24 小時內完成通報？

- ①多重抗藥性結核病
- ②炭疽病
- ③登革熱
- ④肉毒桿菌中毒

【2】4.職業衛生護士在評估打字員時，應特別注意哪一種職業病？

- ①白指病
- ②腕隧道症候群
- ③白內障
- ④內耳聽力受損

【3】5.下列關於國人常見疾病的定義，何者正確？

- ①高血壓為收縮壓高於等於 120 mmHg /舒張壓高於等於 80mmHg
- ②糖尿病為至少 2 次不同時間檢查空腹血糖值超過或等於 100mg/dL
- ③高膽固醇血症為總膽固醇高於或等於 200 mg/dL
- ④高尿酸血症為尿液中的尿酸值高於 5mg/dL

【4】6.護理人員在中老年人慢性病防治功能中，下列何者屬於次段預防？

- ①評估中老年人的環境安全
- ②結合地方衛生局辦理健康促進宣導
- ③提醒民眾定期體檢
- ④於社區舉辦篩檢活動

【2】7.在一個總人口為 10,000 人的社區中，於 2000 年的調查中發現罹患糖尿病的人數有 360 人，2001 年再次調查發現罹患糖尿病的人數為 510 人，假設這期間糖尿病的致死率為 0%，請問 2001 年糖尿病的發生率為多少？

- ① 3.6%
- ② 1.5%
- ③ 5.1%
- ④ 8.7%

【2】8.通過騎乘機車強制戴安全帽立法以降低事故傷害死亡率，符合渥太華憲章中所提健康促進的哪一項行動綱領？

- ①增進個人技能
- ②訂定健康公共政策
- ③創造支持性環境
- ④強化社區行動

【1】9.下列關於社區健康營造之敘述，何者錯誤？

- ①特別強調由上而下之運作
- ②執行時需顧及社區民眾之需求
- ③需考慮不同層次，如個人、組織、或政策、健康相關議題
- ④進行持續性的追蹤與評價

【4】10.社區護理人員如果想深入了解社區互動的情形，了解領導決策者及權利決策過程，用哪一種資料收集方法比較合適？

- ①擋風玻璃式調查
- ②重要人物訪談
- ③問卷調查
- ④參與式觀察

【3】11.某社區實施 500 名民眾高血糖篩檢活動，本來有 60 名高血糖的患者經篩檢後只有 54 名呈陽性，而原本 440 名健康者經檢驗後有 110 名呈陽性，請問此次篩檢的特異性為：

- ① 90%
- ② 67%
- ③ 75%
- ④ 98%

【3】12.自殺防治策略有分全面性、選擇性及指標性三大層面，下列何者為選擇性？

- ①減少致命自殺方法的可得性
- ②加強憂鬱症、酒癮與物質濫用的防治
- ③自殺未遂者追蹤輔導
- ④促進社會大眾心理健康

【4】13.要得知罹患某疾病的所有病人中，有多少人是因為此疾病而死亡，需要看哪一種健康指標？

- ①盛行率
- ②發生率
- ③死亡率
- ④致死率

【2】14.葡萄糖六磷酸去氫酶缺乏症患者(G-6-PD 缺乏症)日常生活照護需注意事項，下列敘述何者正確？

- ①避免食用含有半乳糖的食物
- ②衣櫥及廁所不可以放樟腦丸
- ③有貧血及黃疸是正常現象，多休息即可
- ④如有受傷要使用紫藥水

【3】15.為了預防先天性德國麻疹症候群，育齡婦女接種前應確定未懷孕，接種後幾個月需要避孕？

- ① 1 個月
- ② 2 個月
- ③ 3 個月
- ④ 4 個月

【3】16.公共衛生護理人員在社區中發現兒童身上有不明瘀傷或新舊傷痕、夏天穿冬季長袖衣服、身體清潔狀況差的情形，即應懷疑是否有兒童虐待，向主管機關報案，是屬於三段五級的哪一段預防？

- ①初段第一級預防健康促進
- ②初段第二級預防特殊保護
- ③次段預防
- ④未段預防

【2】17.執行社區健康評估過程有五項必要步驟，請針對先後順序排序：(A)確認目標社區現存的健康計畫是否滿足社區需求 (B)確認目標社區目前進行中的健康促進計畫內容與執行情形 (C)健康社區需求的再確認 (D)確認目標人口群目前的健康狀態 (E)訂定健康問題的優先順序及可能的處理策略

- ① D→A→B→E→C
- ② D→B→A→E→C
- ③ B→A→D→C→E
- ④ A→C→B→E→D

【1】18.日常生活活動功能(activities of daily living, ADLs)可用來評估生理缺損所影響的功能程度，下列何者不是此工具的評估項目？

- ①洗衣服
- ②進食
- ③穿衣服
- ④上下樓梯

【1】19.容易引起巴金森症候群的金屬為：

- ①鎳
- ②砷
- ③汞
- ④鉛

【2】20.我國愛滋病減害計畫防治成效受國際肯定，下列何者非減害計畫措施？

- ①清潔針具
- ②孕婦愛滋篩檢
- ③美沙冬替代療法
- ④愛滋治療、照護及諮詢

【2】21.我國衛生行政組織最高層級為：

- ①縣市政府
- ②衛生署
- ③衛生局
- ④鄉鎮衛生所

【1】22.最近十年內，每年十大死因中常位居首位的是：

- ①惡性腫瘤
- ②心臟病
- ③事故傷害

【2】23.國民教育水準及所得大幅提升後，醫療照護服務需求會：

- ①降低
- ②增加
- ③不一定

【4】24.下列哪一項不是台灣的嚴重環境負荷？

- ①人口密度高
- ②工廠密度高
- ③機動車輛多

【3】25.我國的垃圾處理以下列何種方式佔最多？

- ①掩埋
- ②填海
- ③焚化

【4】26.人口學中自然增加率是：

- ①該年出生嬰數 / 該年年末人口數 × 1000
- ②該年出生嬰數 / 該年年中人口數 × 1000
- ③(該年出生嬰數 - 該年死亡人數) / 該年年末人口數 × 1000
- ④(該年出生嬰數 - 該年死亡人數) / 該年年中人口數 × 1000

【2】27.平均餘命之意義為何？

- ①等於平均壽命
- ②等於出生嬰兒遭受到某一時期之每一年齡組經驗的死亡風險後，他們所能活存的預期壽命
- ③年齡別死亡率
- ④某年的死亡平均年齡

【2】28.疾病盛行率之定義為何？

- ①在某時間內，該健康問題就發生的總人數與總人口比
- ②在某時間內，該健康問題目前已存在的總人數與總人口比
- ③即致病率
- ④即疾病發生率

【2】29.嬰兒死亡率是指幾歲以下死亡的小孩死亡率？

- ① 1 個月以下
- ② 1 歲以下
- ③ 2 歲以下
- ④ 5 歲以下

【3】30.下列何者不屬於判斷流行病致病關係要項？

- ①一貫持續性
- ②時序先後關係
- ③動物實驗進行之有無
- ④劑量效應

【1】31.花生中的黃麴毒素導致以下何種健康危害？

- ①肝癌
- ②腎臟病
- ③肺癌
- ④子宮頸癌

【2】32.消毒是把病原體：

- ①全部消滅
- ②大部分消滅
- ③限制其生長

【2】33.可以預防兒童齲齒的化學物質是：

- ①鈣化物
- ②氟化物
- ③碘化物

【1】34.會產生鼻中膈穿孔的工業化學物為：

- ①鉻酸
- ②鎘化物
- ③砷化物

【2】35.在職業上容易造成癌症的溶劑為：

- ①甲苯
- ②苯
- ③乙苯
- ④二甲苯

【2】36.下列哪種纖維最易致癌？

- ①玻璃
- ②石綿
- ③炭

【2】37.電磁波之特性是波長愈長，其能量愈：

- ①大
- ②小
- ③不一定

【4】38.下列哪一種環境能量不屬於非游離輻射？

- ①紫外線
- ②微波
- ③雷射

【1】39.我國毒性化學物質管理最主要的管理機構為：

- ①環保署
- ②衛生署
- ③農委會
- ④勞委會

【2】40.室內空氣品質，良好的室內溫度對我國人來說，其範圍為：

- ① 20°C~24°C
- ② 25°C~27°C
- ③ 28°C~30°C
- ④ 15°C~19°C